

- Pokud se u Vás kdykoliv vyskytnou **myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu**, **vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici** (viz bod 2).

Kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže:

- Vám zčervená kůže, dojde k různým kožním reakcím, nebo se vám na kůži udělají puchýře nebo se kůže loupá. Je to vzácné.
- máte kombinaci příznaků (známou jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku se zrychleným dýcháním nebo srdečním tepem, pocení, svalovou ztuhlost nebo třes, zmatenost, extrémní agitovanost nebo spavost;
- máte pocit slabosti, ospalosti nebo zmatenosti (převážně u starších osob a (starších) osob užívajících tablety na odvodnění (diuretika);
- **máte prodlouženou a bolestivou erekci;**
- jste podrážděný/á a extrémně neklidný/á.

Následující přehled obsahuje nežádoucí účinky dle četnosti jejich výskytu:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

- nespavost
- **bolest hlavy**
- průjem
- **pocit nevolnosti**
- **únava**

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 uživatelů):

- chybějící pocit hladu, snížení tělesné hmotnosti
- **nervozita, úzkost**
- neklid, potíže s koncentrací
- pocit napětí
- **snížení sexuální touhy nebo sexuální potíže (včetně potíží s udržením erekce pro sexuální aktivitu)**
- problémy se spaním neobvyklé sny, únava nebo spavost závratě
- změny chuti
- nekontrolovatelný třes
- rozmazané vidění
- **pocity rychlého nebo nepravidelného srdečního tepu**
- návaly
- zívání
- zažívací potíže, zvracení
- sucho v ústech
- vyrážka, kopřivka, svědění
- nadměrné pocení
- bolest kloubů
- častější močení
- neobjasněné krvácení z pochvy
- pocit třesu a mrazení

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 uživatelů):

- pocit odcizení se
- podivné myšlenky
- neobvykle dobrá nálada
- **potíže s dosažením orgasmu**
- **myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození**